



Grandes
Cultures

Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 10 du 27/10/94
Supplément N° 1

COLZA

Charançons du bourgeon terminal :

Le vol se termine.

Grosses Altises et Pucerons :

Pas de risque

CEREALES

Pucerons - Cicadelles : A surveiller.

COLZA

Stades : 4 feuilles (B4) à 8 feuilles (B8).

CHARANÇONS DU BOURGEON TERMINAL

★ Situation

De très faibles captures sont localement observées. Le vol se termine.

★ Préconisation

Le traitement a dû être réalisé dans la période du 10 au 18 Octobre.

Aucun renouvellement ne se justifie.

GROSSES ALTISES

Absence d'activité.

PUCERONS

★ Situation

Ils sont quasi absents en culture.

★ Préconisation

Pas d'intervention spécifique.



Publication mensuelle
Abonnement annuel : 230 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

7123

CEREALES

Stades (Semis à effectuer en Limagne)
(Levée à 1-2 feuilles (Sologne - Bocage - Combrailles))

PUCERONS ET J.N.O.

★ Situation

Les infestations sur les cultures levées sont très faibles (de l'ordre de 1 à 2 %).

★ Préconisation

Aucune intervention aphicide ne se justifie. Une surveillance s'impose malgré tout.

Seuil d'intervention : 10 % de pieds porteurs de pucerons.

A noter que les parcelles ensemencées avec des graines traitées GAUCHO sont protégées.

CICADELLES DU BLE ET NANISME DU BLE

★ Situation en AUVERGNE

En AUVERGNE, les dégâts du virus responsable du nanisme sont limités. C'est seulement au cours de la campagne céréalière 1990 que quelques symptômes ont été notés dans les secteurs de SAINT-POURÇAIN-/SIOULE, SAULZET (03) et des PRADEAUX (63).

Un réseau de piégeage à l'aide de cuvettes jaunes nous a permis de situer l'importance des captures de cicadelles vectrices (*Psammotettix alienus*). Cette cicadelle est bien présente à l'automne, particulièrement en Septembre et Octobre mais l'activité décroît rapidement après le 25 Octobre.

C'est ainsi que les semis les plus précoces sont toujours les plus exposés.

Les semis sont globalement tardifs (après le 25/10), dans les secteurs potentiellement concernés de notre région.

★ Situation en 94

Une activité assez soutenue a eu lieu au cours de la dernière période douce et ensoleillée sur repousses. Actuellement, les captures sont faibles.

★ Préconisation

Schéma de la cicadelle *Psammotettix*
(adulte)



Le risque cicadelles concerne très peu de parcelles : uniquement celles qui sont levées actuellement et celles ayant un micro-climat et un environnement favorable (situations abritées, proximité de bois, de haies, de chaumes et aussi de jachères).

Une intervention très ponctuelle se raisonne à la parcelle (présence de cicadelles grise par beau temps).

Le blé est très sensible au stade 1-2 feuilles.

En cas d'intervention, choisir un insecticide homologué. Consulter le dépliant vert I.T.C.F. - S.P.V - I.N.R.A. "CEREALES - INSECTICIDES".

Les parcelles traitées GAUCHO sont protégées.

Taille : 3,6 à 4 mm
Couleur : marron clair